

各 位

八戸市医師会
臨床検査センター

お 知 ら せ

平素、当検査センターをご利用いただきありがとうございます。
外注先（BML・SRL）より検査内容変更、中止項目に関する連絡がありましたのでお知らせいたします。

記

* BML

検査内容変更項目

変更日…令和3年4月1日(木)受付分より

検査項目	変更箇所	新	現
LDアイソザイム	項目名称	LDアイソザイム/IF	LDアイソザイム
	基準値 (単位)	LD 1 20.0~31.0 LD 2 28.8~37.0 LD 3 21.5~27.6 LD 4 6.3~12.4 LD 5 5.4~13.2 総活性値 120~245 LD 1 定量 24~76 LD 2 定量 35~91 LD 3 定量 26~68 LD 4 定量 8~30 LD 5 定量 6~32 分画値 : % 定量値 : U/L	LD 1 20~32 LD 2 28~35 LD 3 21~27 LD 4 6~13 LD 5 4~14 総活性値 120~245 LD 1 定量 24~78 LD 2 定量 34~86 LD 3 定量 25~66 LD 4 定量 7~32 LD 5 定量 5~34 Hサブユニット 55~70 Mサブユニット 30~45 LD1/LD2 0.65~1.00 LD3/LD1 0.65~1.25 LD5/LD4 0.45~1.30 分画値, サブユニット値 : % 定量値 : U/L
ALPアイソザイム	項目名称	ALPアイソザイム/IF	ALPアイソザイム
	基準値 (単位)	ALP 1 0.0~5.3 ALP 2 36.6~69.2 ALP 3 25.2~54.2 ALP 4 0.0 ALP 5 0.0~18.1 ALP 6 0.0 %	ALP 1 0 ALP 2 36~74 ALP 3 25~59 ALP 4 0 ALP 5 0~16 ALP 6 0 %
IgG4/TIA	項目名称	IgG4/LA	IgG4/TIA
	検査方法	ラテックス凝集比濁法	免疫比濁法
	基準値 (単位)	11~121 (mg/dL)	5~117 (mg/dL)
ADA-血清	検査方法	酵素法	UV法(酵素法)
	基準値(単位)	4.8~23.1 (U/L)	7.8~21.1 (U/L)
ADA-胸水	検査方法	酵素法	UV法(酵素法)

検査項目	変更箇所	新	現
活性型レニン定量 (ARC)	項目名称	活性型レニン定量/CLEIA	活性型レニン定量
	検体必要量	血漿0.5mL	血漿0.7mL
	検査方法	CLEIA法	IRMA法(RIA・固相法)
	基準値 (単位)	2.21~39.49 (pg/mL)	臥位: 2.5~21.4 立位: 3.6~63.7 (pg/mL)
PAC/PRA (アルドステロン・ レニン活性比)	検査方法	計算法	RIA・固相法、EIA法
	基準値 (単位)	比: 200以下(カットオフ値) PAC RIA相当値: pg/mL 比: なし	アルドステロン及びレニン活性参照 PAC : pg/mL PRA : pg/mL/hr PAC/PRA: なし
	備考	PAC/PRA(アルドステロン/レニン活性比)は、アルドステロンCLEIAとレニン活性の2項目同時にご依頼下さい。	—
PAC/ARC (アルドステロン・ 活性型レニン定量比)	検査方法	計算法	RIA・固相法
	基準値 (単位)	比: 40以下(カットオフ値) PAC RIA相当値: pg/mL 比: なし	アルドステロン及びレニン定量参照 PAC/ARC: pg/mL PAC/ARC: なし
	備考	PAC/ARC(アルドステロン/活性型レニン定量比)は、アルドステロンCLEIAと活性型レニン定量の2項目同時にご依頼下さい。	—

検査受託中止項目

最終受託日…令和3年3月27日(土) 受付分まで

検査項目	代替項目	備考
アネキサIgG・IgA抗体	なし	測定試薬販売中止のため

最終受託日…令和3年3月31日(水) 受付分まで

検査項目	代替項目	備考
特異的IgE (CAPシングルアルレルゲン) m70: ヒトテロスポリウム	特異的IgE (CAPシングルアルレルゲン) m227: マラセチア(属)	測定試薬販売中止のため
特異的IgE (CAPシングルアルレルゲン) f57: ヒエ	なし	測定試薬販売中止のため
TAP-18	View アルルギン 39 (View 39)	セット構成項目の「m70: ヒトテロスポリウム」測定試薬販売中止のため

*** SRL**
検査内容変更項目

変更日…令和3年4月1日(木)受付分より

検査項目	変更箇所	新	現
アルドステロン	項目名称	アルドステロン[CLEIA]	アルドステロン
	検査方法	CLEIA	RIA固相法
	血漿 基準値 (単位)	4.0～82.1 (pg/mL)	随時 35.7～240 臥位 29.9～159 立位 38.9～307 (pg/mL)
	畜尿 基準値 (単位)	1.0～19.3 (μg/day)	10以下 (μg/day)
	畜尿 所要日数	5～7日	3～7日
レニン活性	項目名称	レニン活性(PRA) [EIA]	レニン活性(PRA)
	検体量	血漿0.7mL	血漿0.3mL
	検査方法	EIA	RIA2抗体法
	基準値 (単位)	臥位 0.2～2.3 座位 0.2～3.9 立位 0.2～4.1 (ng/mL/hr)	臥位 0.3～2.9 立位 0.3～5.4 (ng/mL/hr)
IV型コラーゲン・7S 〔CLEIA〕	項目名称	IV型コラーゲン・7S [CLEIA]	IV型コラーゲン・7S
	所要日数	2～4日	3～5日
	検査方法	CLEIA	RIA2抗体法
	基準値(単位)	4.4以下 (ng/mL)	6以下 (ng/mL)
便中ヘリコバクター ピロリ抗原	容器		
	備考	旧容器にてご依頼の場合、参考値となります。	