

各 位

八戸市医師会
臨床検査センター

お 知 ら せ

平素、当検査センターをご利用いただきありがとうございます。
外注先（SRL）より検査内容変更項目に関する連絡がありましたのでお知らせいたします。

記

* S R L

検査内容変更項目

変更日…令和3年10月1日（木）受付分より

検査項目	変更箇所	新	現
トリヨードサイロニン(T3)	項目名称	トリヨードサイロニン(T3) [CLEIA]	トリヨードサイロニン(T3)
	検体量	血清0.5mL	血清 0.3mL
	検査方法	CLEIA	ECLIA
	基準値	0.62~1.16 ng/mL	0.80~1.60 ng/mL
サイロキシン(T4)	項目名称	サイロキシン(T4) [CLEIA]	サイロキシン(T4)
	検体量	血清0.5mL	血清 0.3mL
	検査方法	CLEIA	ECLIA
	基準値	4.53~8.38 µg/dL	6.10~12.4 µg/dL
TSHレセプター抗体(第3世代)	項目名称	TSHレセプター抗体 [CLEIA]	TSHレセプター抗体 [第3世代]
	検体量	血清0.8mL	血清0.5mL
	検査方法	CLEIA	ECLIA
抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体(抗TPO抗体)	項目名称	抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体(抗TPO抗体) [CLEIA]	抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体(抗TPO抗体)
	検査方法	CLEIA	ECLIA
	基準値	3.3未満 IU/mL	16未満 IU/mL

検査項目	変更箇所	新	現
抗サイログロブリン抗体	項目名称	抗サイログロブリン抗体〔CLEIA〕	抗サイログロブリン抗体
	検査方法	CLEIA	ECLIA
	基準値	19.3未満 IU/mL	28未満 IU/mL
サイログロブリン	項目名称	サイログロブリン〔CLEIA〕	サイログロブリン
	検査方法	CLEIA	ECLIA
	基準値	35.1以下 ng/mL	33.7以下 ng/mL